

## ワクチン一覧表

予防接種の種類		対象年齢	標準的な接種時期
BCG（結核）		生後1歳に至るまで	生後5か月～8か月
ヒブ	初回	生後2か月から60か月 （5歳）に至るまで	生後2か月から27日～56日の間隔をあけて3回接種
	追加		初回の3回目を終了してから7か月～13か月の間隔をあけて1回接種
小児用肺炎球菌	初回	生後2か月から60か月 （5歳）に至るまで	生後2か月から27日以上の間隔をあけて3回接種
	追加		初回の3回目を終了してから60日以上の間隔をあけて生後12～15か月の間に1回接種
DPT-IPV（4種混合） （ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ）	1期初回	生後3か月から90か月 （7歳6か月）に至るまで	生後3か月から20～56日の間隔をあけて3回接種
	1期追加		1期初回の3回目を終了してから12か月～18か月の間に1回
MR （麻しん風しん混合）	1期	生後12か月から24か月に至るまで	1歳以降なるべく早い時期
	2期	小学校入学就学前の4月から3月31日まで	—
風しん	5期	昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性※①	
日本脳炎	1期	生後6か月から90か月（7歳6か月）に至るまで	3歳から6～28日の間隔をあけて2回接種
	1期追加		4歳
	1期特例	20歳未満 （平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれ）	—
	2期	9歳以上13歳未満まで	9歳
	2期特例	20歳未満 （平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれ）	—
DT2期（ジフテリア・破傷風）		11歳以上13歳未満まで	11歳
水痘（みずぼうそう）		生後12か月から36か月に至るまで	1回目：生後12～15か月 2回目：1回目の接種後6か月～12か月
B型肝炎		平成28年4月生まれ～	

※①・・・風しん抗体検査を受けた結果、十分な量の風しん抗体価があると判明し、予防接種は必要ないと認められた者を除く。