

# ワクチン一覧表

予防接種の種類		対象年齢	標準的な接種時期
BCG (結核)		生後1歳に至るまで	生後5か月～8か月
ヒブ	生後2か月～5歳未満	生後2か月～7か月未満で接種を開始した場合	【間隔】：27～56日間隔 【間隔】：3回目の接種後7～13か月の間に接種
		生後7か月～12か月未満で接種を開始した場合	【間隔】：27～56日間隔 【間隔】：2回目の接種後7～13か月の間に接種
		1歳～5歳未満で接種を開始した場合	
小児用肺炎球菌	初回	生後2か月から60か月 (5歳)に至るまで	生後2か月から27日以上の間隔をあけて3回接種
	追加		初回の3回目を終了してから60日以上の間隔をあけて生後12～15か月の間に1回接種
DPT-IPV (4種混合) (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)	1期初回	生後3か月から90か月 (7歳6か月)に至るまで	生後3か月から20～56日の間隔をあけて3回接種
	1期追加		1期初回の3回目を終了してから12か月～18か月の間に1回
MR (麻しん風しん混合)	1期	生後12か月から24か月に至るまで	1歳以降なるべく早い時期
	2期	小学校入学就学前の4月から3月31日まで	—
日本脳炎	1期	生後6か月から90か月(7歳6か月)に至るまで	年齢：3歳 間隔：6～28に価間隔
	1期追加		年齢：4歳 間隔：初回接種終了後おおむね1年あける
	1期特例	20歳未満 (平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれ)	—
	2期	9歳以上13歳未満まで	9歳
	2期特例	20歳未満 (平成7年4月2日～平成21年10月1日生まれ)	—
DT2期 (ジフテリア・破傷風)		11歳以上13歳未満まで	11歳
水痘 (みずぼうそう)		生後12か月から36か月に至るまで	1回目：生後12～15か月
			2回目：1回目の接種後6か月～12か月
B型肝炎		1歳未満	【月齢】生後2か月～9か月未満
ロタウイルス		生後6週～24週 ロタリックス(1価)	初回接種 ：【月齢】生後2月～出生14週6日
		生後6週～32週 ロタテック (5価)	
HPV (子宮頸癌予防)		小学6年～高校1年相当の女子 サーバリックス(2価)	年齢：中学1年生 間隔：0、1、6か月後に接種
		小学6年～高校1年相当の女子 ガーダシル(4価)	年齢：中学1年生 間隔：0、2、6か月後に接種