

定期 A 類予防接種一覧表

R5.4.1

予防接種名	対象年齢	区分	接種回数	接種間隔上の注意（厳守）	標準的な接種年齢・接種間隔	備考	
ロタウイルス	生後6週～24週0日	ロタリックス	2回	27日以上の間隔をあける	初回接種については、生後2か月に至った日から出生14週6日後までの間		
	生後6週～32週0日	ロタテック	3回				
B型肝炎	1歳未満		3回	27日以上の間隔で2回接種し、第1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回。	【月齢】生後2か月～9か月未満		
Hib	生後2か月～5歳未満	生後2か月～7か月未満で接種を開始した場合	初回	3回	27日以上あける ※医師が必要と認めた場合は20日間隔から接種可 ※3回目の接種は生後12か月に至るまでに完了する	【間隔】27～56日間隔	初回接種は生後12か月に至るまでに行い、それを越えた場合は行わないこと。 この場合、追加接種は可能で、初回接種の最後の注射終了後、27日（医師が必要と認めた場合は20日）以上の間隔をおいて行うこと。
			追加	1回	3回目の接種後7か月以上あける	【間隔】3回目の接種後7～13か月の間に接種	
		生後7か月～12か月未満で接種を開始した場合	初回	2回	27日以上あける ※医師が必要と認めた場合は20日間隔から接種可 ※2回目の接種は生後12か月に至るまでに完了する	【間隔】27～56日間隔	
			追加	1回	2回目の接種後7か月以上あける	【間隔】2回目の接種後7～13か月の間に接種	
		1歳～5歳未満で接種を開始した場合	1回				
小児の肺炎球菌	生後2か月～5歳未満	生後2か月～7か月未満で接種を開始した場合	初回	3回	27日以上の間隔をあける ※2回目の接種が生後12か月を超えた場合、3回目は行わない ※3回目の接種は生後24か月に至るまでに完了する	【月齢】生後12か月までに完了する	
			追加	1回	生後12か月以降に、初回接種終了後60日以上の間隔をあける	【月齢】生後12か月～15か月	
		生後7か月～12か月未満で接種を開始した場合	初回	2回	27日以上の間隔をあける ※2回目の接種は生後24か月に至るまでに完了する	【月齢】生後12か月までに完了する	
			追加	1回	生後12か月以降に、初回接種終了後60日以上の間隔をあける		
				1歳～2歳未満で接種を開始した場合	2回	60日以上の間隔をあける	
		2歳～5歳未満で接種を開始した場合	1回				
四種混合	1期	生後2か月～90か月未満	初回	3回	20日以上の間隔をあける	【月齢】生後2か月～12か月 【間隔】20～56日間隔	
			追加	1回	初回接種終了後6か月以上あける	【間隔】初回接種終了から12～18か月後	

定期 A 類予防接種一覧表

R5.4.1

予防接種名	対象年齢		区分	接種回数	接種間隔上の注意（厳守）	標準的な接種年齢・接種間隔	備考
不活化ポリオ	1期	生後2か月～90か月未満	初回	3回	20日以上の間隔をあける	【年齢】 生後2か月～12か月 【間隔】 20～56日間隔	生ポリオワクチンを1回接種している場合、生ポリオワクチンの接種を1回目としてカウントする
			追加	1回	初回接種終了後6か月以上あける	【間隔】 初回接種終了から12～18か月後	
BCG	1歳未満			1回		【年齢】 生後5か月～8か月	
麻しん・風しん	1期	生後12か月～24か月未満		1回		【年齢】 1歳になったらなるべく早く	MRワクチンの代わりに麻しんまたは風しんの単独ワクチンを接種することが可能
	2期	5歳以上7歳未満であって小学校就学前の1年間		1回			
水痘	生後12か月～36か月未満		初回	1回		【年齢】 生後12か月～15か月	
			追加	1回	初回の接種後3か月以上あける	【間隔】 初回接種終了から6～12か月後	
日本脳炎	1期	生後6か月～90か月未満	初回	2回	6日以上の間隔をあける	【年齢】 3歳 【間隔】 6～28日間隔	接種量に注意 3歳未満：0.25mL 3歳以上：0.5mL 【特例】 別紙（日本脳炎の定期予防接種【特例対象者】についてに記載
			追加	1回	初回接種終了後6か月以上あける	【年齢】 4歳 【間隔】 初回接種終了後おおむね1年あける	
	2期	9歳～13歳未満		1回		【年齢】 9歳	
二種混合	2期	11歳～13歳未満		1回		【年齢】 11歳	
HPV ※子宮頸がん予防	小学6年～高校1年相当の女子		サーバリックス（2価）	3回	2回目：1回目から1か月以上の間隔をあける 3回目：1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上の間隔をあける	【年齢】 中学1年生 【間隔】 0、1、6か月後に接種	キャッチアップ接種も令和6年度末まで実施
			ガーダシル（4価）	3回	2回目：1回目から1か月以上あける 3回目：2回目から3か月以上あける	【年齢】 中学1年生 【間隔】 0、2、6か月後に接種	
			シルガード9（9価）	3回	2回目：1回目から1か月以上あける 3回目：2回目から3か月以上あける	【年齢】 中学1年生 【間隔】 0、2、6か月後に接種	
				2回	2回目：1回目から5か月以上あける ※1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合	【年齢】 中学1年生 【間隔】 0、6か月後に接種	