

## 定期 A 類予防接種一覧表

①

R7.4.1

| 予防接種名   | 対象年齢               | 区分                     | 接種回数 | 接種間隔上の注意（厳守）                                                                    | 標準的な接種年齢・接種間隔                      | 備考                                                                                                     |
|---------|--------------------|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ロタウィルス  | 生後6週～24週0日         | ロタリックス                 | 2回   | 27日以上の間隔をあける                                                                    | 初回接種については、生後2か月に至った日から出生14週6日後までの間 |                                                                                                        |
|         | 生後6週～32週0日         | ロタテック                  | 3回   |                                                                                 |                                    |                                                                                                        |
| B型肝炎    | 1歳未満               |                        | 3回   | 27日以上の間隔で2回接種し、第1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回。                                        | 【月齢】生後2か月～9か月未満                    |                                                                                                        |
| Hib     | 生後2か月～5歳未満         | 生後2か月～7か月未満で接種を開始した場合  | 初回   | 3回<br>27日以上あける<br>※医師が必要と認めた場合は20日間隔から接種可<br>※3回目の接種は生後12か月に至るまでに完了する           | 【間隔】27～56日間隔                       | 初回接種は生後12か月に至るまでに行い、それを越えた場合は行わないこと。<br>この場合、追加接種は可能で、初回接種の最後の注射終了後、27日（医師が必要と認めた場合は20日）以上の間隔をおいて行うこと。 |
|         |                    |                        | 追加   | 1回<br>3回目の接種後7か月以上あける                                                           | 【間隔】3回目の接種後7～13か月の間に接種             |                                                                                                        |
|         |                    | 生後7か月～12か月未満で接種を開始した場合 | 初回   | 2回<br>27日以上あける<br>※医師が必要と認めた場合は20日間隔から接種可<br>※2回目の接種は生後12か月に至るまでに完了する           | 【間隔】27～56日間隔                       |                                                                                                        |
|         |                    |                        | 追加   | 1回<br>2回目の接種後7か月以上あける                                                           | 【間隔】2回目の接種後7～13か月の間に接種             |                                                                                                        |
|         |                    | 1歳～5歳未満で接種を開始した場合      |      | 1回                                                                              |                                    |                                                                                                        |
|         |                    |                        |      |                                                                                 |                                    |                                                                                                        |
| 小児の肺炎球菌 | 生後2か月～5歳未満         | 生後2か月～7か月未満で接種を開始した場合  | 初回   | 3回<br>27日以上の間隔をあける<br>※2回目の接種が生後12か月を超えた場合、3回目は行わない<br>※3回目の接種は生後24か月に至るまでに完了する | 【月齢】生後12か月までに完了する                  |                                                                                                        |
|         |                    |                        | 追加   | 1回<br>生後12か月以降に、初回接種終了後60日以上の間隔をあける                                             | 【月齢】生後12か月～15か月                    |                                                                                                        |
|         |                    | 生後7か月～12か月未満で接種を開始した場合 | 初回   | 2回<br>27日以上の間隔をあける<br>※2回目の接種は生後24か月に至るまでに完了する                                  | 【月齢】生後12か月までに完了する                  |                                                                                                        |
|         |                    |                        | 追加   | 1回<br>生後12か月以降に、初回接種終了後60日以上の間隔をあける                                             |                                    |                                                                                                        |
|         |                    | 1歳～2歳未満で接種を開始した場合      |      | 2回<br>60日以上の間隔をあける                                                              | 【間隔】60日以上の間隔をあける                   |                                                                                                        |
|         |                    | 2歳～5歳未満で接種を開始した場合      |      | 1回                                                                              |                                    |                                                                                                        |
| 五種混合    | 1期<br>生後2か月～90か月未満 | 初回                     |      | 3回<br>20日以上の間隔をあける                                                              | 【月齢】生後2か月～7か月<br>【間隔】20～56日間隔      |                                                                                                        |
|         |                    | 追加                     |      | 1回<br>初回接種終了後6か月以上あける                                                           | 【間隔】初回接種終了から6～18か月後                |                                                                                                        |
| 四種混合    | 1期<br>生後2か月～90か月未満 | 初回                     |      | 3回<br>20日以上の間隔をあける                                                              | 【月齢】生後2か月～12か月<br>【間隔】20～56日間隔     |                                                                                                        |
|         |                    | 追加                     |      | 1回<br>初回接種終了後6か月以上あける                                                           | 【間隔】初回接種終了から12～18か月後               |                                                                                                        |

## 定期 A 類予防接種一覧表

①

R7.4.1

| 予防接種名           | 対象年齢           |                        | 区分          | 接種回数 | 接種間隔上の注意（厳守）                                               | 標準的な接種年齢・接種間隔                    | 備考                                                                               |
|-----------------|----------------|------------------------|-------------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 不活化ポリオ          | 1期             | 生後2か月～90か月未満           | 初回          | 3回   | 20日以上の間隔をあける                                               | 【月齢】 生後2か月～12か月<br>【間隔】 20～56日間隔 | 生ポリオワクチンを1回接種している場合、生ポリオワクチンの接種を1回目としてカウントする                                     |
|                 |                |                        | 追加          | 1回   | 初回接種終了後6か月以上あける                                            | 【間隔】 初回接種終了から12～18か月後            |                                                                                  |
| B C G           | 1歳未満           |                        |             | 1回   |                                                            | 【月齢】 生後5か月～8か月                   |                                                                                  |
| 麻しん・風しん         | 1期             | 生後12か月～24か月未満          |             | 1回   |                                                            | 【年齢】 1歳になったらなるべく早く               | MRワクチンの代わりに麻しんまたは風しんの単独ワクチンを接種することが可能                                            |
|                 | 2期             | 5歳以上7歳未満であって小学校就学前の1年間 |             | 1回   |                                                            |                                  |                                                                                  |
| 水痘              | 生後12か月～36か月未満  |                        | 初回          | 1回   |                                                            | 【月齢】 生後12か月～15か月                 |                                                                                  |
|                 |                |                        | 追加          | 1回   | 初回の接種後3か月以上あける                                             | 【間隔】 初回接種終了から6～12か月後             |                                                                                  |
| 日本脳炎            | 1期             | 生後6か月～90か月未満           | 初回          | 2回   | 6日以上の間隔をあける                                                | 【年齢】 3歳<br>【間隔】 6～28日間隔          | 接種量に注意<br>3歳未満：0.25mL<br>3歳以上：0.5mL<br><br>【特例】<br>別紙（日本脳炎の定期予防接種【特例対象者】）についてに記載 |
|                 |                |                        | 追加          | 1回   | 初回接種終了後6か月以上あける                                            | 【年齢】 4歳<br>【間隔】 初回接種終了後おおむね1年あける |                                                                                  |
|                 | 2期             | 9歳～13歳未満               |             | 1回   |                                                            | 【年齢】 9歳                          |                                                                                  |
| 二種混合            | 2期             | 11歳～13歳未満              |             | 1回   |                                                            | 【年齢】 11歳                         |                                                                                  |
| HPV<br>※子宮頸がん予防 | 小学6年～高校1年相当の女子 |                        | サーバリックス（2価） | 3回   | 2回目：1回目から1か月以上の間隔をあける<br>3回目：1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上の間隔をあける | 【年齢】 中学1年生<br>【間隔】 0、1、6か月後に接種   | キャッチアップ接種終了に伴う経過措置あり                                                             |
|                 |                |                        | ガーダシル（4価）   | 3回   | 2回目：1回目から1か月以上あける<br>3回目：2回目から3か月以上あける                     | 【年齢】 中学1年生<br>【間隔】 0、2、6か月後に接種   |                                                                                  |
|                 |                |                        | シルガード9（9価）  | 3回   | 2回目：1回目から1か月以上あける<br>3回目：2回目から3か月以上あける                     | 【年齢】 中学1年生<br>【間隔】 0、2、6か月後に接種   |                                                                                  |
|                 |                |                        |             | 2回   | 2回目：1回目から5か月以上あける<br>※1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合                | 【年齢】 中学1年生<br>【間隔】 0、6か月後に接種     |                                                                                  |